


ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ;

→ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ!



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Απόφραξη των αεραγωγών ή συριγμός, σάλια, έμετος, δυσφορία στο στήθος, δυσκολία στην κατάποση, μειωμένη όρεξη, άρνηση φαγητού, βήχας, πνιγμός

<6 ΧΡΟΝΙΑ

ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΥΠΟΜΟΝΕΤΙΚΟΣ

1

<2

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!

→ ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ




<12h

(>1 έτος) μετά από κατάποση για να γεφυρωθεί ο χρόνος αναμονής δώστε 2 κουταλιές της σούπας μέλι κάθε 10 λεπτά έως και 6 φορές



2




ΑΜΕΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ

<12

Διάγνωση: Ακτινογραφία θώρακα, λαιμού & κοιλίας σε 2 επίπεδα σε περίπτωση παρατεταμένου ιστορικού/υποψίας οισοφαγικής βλάβης που έχει ήδη εμφανιστεί > 12 ώρες εξετάστε το ενδεχόμενο CT πριν την ενδοσκοπική αφαίρεση

3



ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ

Προετοιμαστείτε για **αστάθεια**

4



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Εξετάστε 50 - 150 ml άρδευση **0,25% οξικού οξέος** μετά την αφαίρεση εάν δεν υπάρχουν σημάδια διάτρησης/συρρίγματος

