


LENYELT ELEM?

→ KÖVESD EZEKET A LÉPÉSEKET!



TÜNETEK:

Légúti elzáródás vagy sípoló légzés, nyáladás, hányás, mellkasi kellemetlen érzés, nyelési nehézség, csökkent étvágy, étkezés megtagadása, köhögés, fulladás

<6 ÉV

NAGY KOCKÁZATÚ BETEG

1 **<2**
azonnal cselekedj!
→ ne várd meg a tüneteket



<12 óra

(>1 év) lenyelés után ha várakozni kell, adj 2 evőkanál mézet 10 percenként, akár 6x



2
Azonnali
endoszkópos
eltávolítás

<12


Diagnózis: Mellkas, nyak és has röntgen 2 irányból ha a kórelőzmény elhúzódo vagy több mint 12 órája keletkezett nyelőcső-sérülés gyanúja merül fel, az endoszkópos eltávolítás előtt fontolja meg a CT-t



3
Mérd fel a
lehetséges vérzés
kockázati
tényezőit

Készülj fel az
instabilitásra

4
Fekvőbeteg
megfigyelés



Az eltávolítás után 50 – 150 ml **0,25%-os ecetsavas** irrigálás szóba jön, amennyiben nincs jel perforációra vagy fisztulára



#POWERSAFELY is a joint initiative of



European Academy of Paediatrics
Paediatric Section of U.E.M.S

& **DURACELL®**

Supported by

