


ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ;

→ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ!



ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ:

Απόφραξη των αεραγωγών ή συριγμός, σάλια, έμετος, δυσφορία στο στήθος, δυσκολία στην κατάποση, μειωμένη όρεξη, άρνηση φαγητού, βήχας, πνιγμός

<6 ΧΡΟΝΩΝ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

1

<2

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ!

→ ΜΗΝ
ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ




<12h

(>1 έτος) μετά από κατάποση για να γεφυρωθεί ο χρόνος αναμονής δώστε 2 κουταλάκια του γλυκού μέλι κάθε 10 λεπτά έως και 6 φορές



2




ΑΜΕΣΗ
ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΑΦΑΙΡΕΣΗ

<12

Διάγνωση: Ακτινογραφία θώρακα, λαιμού & κοιλίας σε 2 επίπεδα σε περίπτωση παρατεταμένου ιστορικού/υποψίας οισοφαγικής βλάβης που έχει ήδη εμφανιστεί > 12 ώρες εξετάστε το ενδεχόμενο CT πριν την ενδοσκοπική αφαίρεση

3



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ

Προετοιμασία για **ασταθή κατάσταση**

4



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Εξετάστε την πλύση με 50 - 150 ml **0,25% οξικό οξύ**, αν μετά την αφαίρεση δεν υπάρχουν σημάδια διάτρησης/συρρίγματος.

