


# LENYELT ELEM?

## → KÖVESD EZEKET A LÉPÉSEKET!



### TÜNETEK:

Légúti elzáródás vagy sípoló légzés, nyáladzás, hányás, mellkasi kellemetlen érzés, nyelési nehézség, csökkent étvágy, étkezés megtagadása, köhögés, fulladás

# <6 ÉV

# NAGY KOCKÁZATÚ BETEG

1



azonnal cselekedj!  
→ ne várd meg a tüneteket




<12 óra

(>1 év) lenyelés után ha várakozni kell, adj 2 teáskanál mézet 10 percenként, akár 6x



2




Azonnali endoszkópos eltávolítás



**Diagnózis: Mellkas, nyak és has röntgen 2 irányból** ha a kórelőzmény elhúzódó vagy több mint 12 órája keletkezett nyelőcső-sérülés gyanúja merül fel, az endoszkópos eltávolítás előtt fontolja meg a CT-t

3



Mérd fel a lehetséges vérzés kockázati tényezőit

Készülj fel az **instabilitásra**



4



Fekvőbeteg megfigyelés

Az eltávolítás után 50 – 150 ml **0,25%-os ecetsavas** irrigálás szóba jön, amennyiben nincs jel perforációra vagy fisztulára

